

1998.4

抗HIV薬一覧

1998.4

商品名	逆転写酵素阻害剤						非ヌクレオチド系	プロテアーゼ阻害剤			
	レトロビル	エビビル	ゼリット	グァイテックス	グァイテックスDS	ハイビッド	B I R G 5 8 7	クリキシバン	インビラーゼ	ノービア	ビラセプト
一般名	ジドブジン アジドチジン	ラミブジン	サニドブジン スタドブジン	ジダブジン	ジダブジン	ザルシタピン ジテオキシチジン	ネビラテン	インジナビル	メシム酸サキタビル	リトナビル	ネプフィナビル
略称	A Z T	3 T C	d 4 T	d d l	d d l	d d C	N V P	I D V	S Q V	R T V	N F V
含有量	100mg	150mg	15/20mg	100mg	167/250mg	0.375mg	200mg	200mg	200mg	100mg	250mg
薬価	¥377.5	¥1128.6	¥582.6	¥1100.0	1374.8/2199.1	¥783.6	治験中	¥141.5	¥188.7	¥141.5	¥188.7
用量	4 C / 分4 6時間毎	2 T / 分2 12時間毎	4 C / 分2 12時間毎	4 T / 分2 12時間毎 (50Kg以上)	500mg / 分2 12時間毎 (50Kg以上)	6 T / 分3 8時間毎	2 T / 分2	12 C / 分3 8時間毎	9 C / 分3	12 C / 分2	9 T / 分3
食事	影響なし	影響なし	影響なし	食間(空腹時)	食間(空腹時)	影響なし	影響なし	食間(空腹時)	食後	食後	食後
30日薬価	¥45,300	¥67,716	¥69,912	¥132,000	¥131,946	¥141,048	-	¥50,940	¥50,949	¥50,940	¥50,949
禁忌 注意	イブuprofen アセトミノフェン アスピリン インドメタシン		60Kg以上 80mg/日 60Kg以下 60mg/日	ミマイシン、ヒパラマ イシン、クラビッド、シ ブロキサム、ロメパ ス、オキサリ ン、 錠剤が大きい まずい	まずい	ヘキサミン	ワファリン、カマメット、 リファジン、エリスロシン、 オコピリン、ラスチン	リファジン、アセナリン、 リサモール、トリルチン、 ハルシオン、トミカム、 コンスタン、ソラナックス、 Grape Fruit Juice 1.5l以上の 水と共に服用	リファジン Grape Fruit Juice	フェルテン、アセナリン、カ フェコット、システル ゴット、トリルチン、ヒス マナー、セキシ、メント ン、コンスタン、ユーロジ ン、 タムコール、ブロン、 アノロン、オーラップ	リファジン、アセナ リン、リサモール、トリ ルチン、ハルシオン、 トミカム
主な副作用	食欲不振 吐き気 全身倦怠感 貧血 血小板減少 頭痛・不眠 発疹・不安 めまい	食欲不振 吐き気 全身倦怠感 貧血 血小板減少 頭痛・不眠 発疹・不安 めまい (AZT併用)	末梢神経障害 肺炎	末梢神経障害 下痢 肺炎(現在の 投与量では発 現の可能性低 い)	末梢神経障害 下痢 肺炎(現在の 投与量では発 現の可能性少 い)	末梢神経障害 (継続投与 →非可逆性 休薬→回復) 肺炎	発疹 (重症例あり 開始28日以内 に発現) 嘔気、傾眠、疲労、 頭痛、発熱、下痢	腎結石 嘔気・嘔吐 頭痛 血友病患者に 特異的な 突発性出血 (関節内出血)	副作用少ない	悪心・嘔吐、 下痢、口周囲 のしびれ 冷所保存 6capでビル 20ml程度の アルコールを含む	発疹 (開始7-13 日後多い) 水様性下痢